

TABEL A: Oversigt over de studier, som artiklen “COPM: State of Art” baseres på

PUBLIKATION	DELTAGERE OG METODE
1 Enemark Larsen A. 2019. PhD-afhandling: Exploring client-centred practice in Danish occupational therapy and the influence of the Canadian Occupational Performance Measure.	Udover artikel 3-5, indeholder min Ph.D også en spørgeskemaundersøgelse af danske ergoterapeuters oplevelse af klientcentreret praksis (15).
2 Enemark Larsen A, Carlsson G. Utility of the Canadian Occupational Performance Measure as an admission and outcome measure in interdisciplinary community-based geriatric rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2012;19:204–13	Atten ergoterapeuter og fysioterapeuter fra træningscentre i Københavns Kommune deltog i et studie, der afprøvede COPM's evne som tværfagligt visitationsredskab. 124 geriatriske klienter blev inkluderet og gennemførte præ-test, mens 95 gennemførte post-test. Alle de deltagende terapeuter besvarede efterfølgende et spørgeskema om deres oplevelser af brugen af COPM. COPM's evne til at demonstrere forandring blev analyseret med Wilcoxon Signed-Rank Test. Forskel i opnåede data mellem ergoterapeuter og fysioterapeuter blev analyseret med Pearson's chi-squared test. Data fra spørgeskemaet om terapeuternes oplevelse af COPM's anvendelighed blev analyseret med deskriptiv statistik og en fire-trins modificeret grounded theory metode.
3 Enemark Larsen A, Morville A-L, Hansen T. Translating the Canadian Occupational Performance Measure into Danish. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2019; 26(1):33-45	En oversættelsesproces i flere trin blev gennemført. Heri blev inkluderet professionelle oversættere og to-sprogede ergoterapeuter, samt 15 ergoterapeuter og 37 af deres klienter, der deltog i pilot-testning og efterfølgende blev interviewet (kognitive debriefing). Heri indgik også vurdering af Content validity index (CVI). Deltagerne kom fra både somatiske og psykiatriske hospitaler og kommunale institutioner. Afsluttende blev redskabet tilbageoversat til engelsk og godkendt af de canadiske forfattere.
4 Enemark Larsen A, Rasmussen BA, Christensen JR. Enhancing a client-centred practice with the Canadian Occupational Performance Measure, A Scoping Review. Occupational Therapy International. 2018;595630:1-11	Et scoping review i fem trin blev gennemført. Først blev en søgestrategi udformet, denne blev gennemført i relevante databaser, identificeret materiale såvel publiceret som upubliceret blev accepteret og data herfra udtrukket. Endelig blev data fra de 12 inkluderede studier analyseret med en kvalitativ indholdsanalyse.
5 Enemark Larsen A, Winge CJ, Christensen JR. Clinical Utility of the Danish Version of the Canadian Occupational Performance Measure. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Epub ahead of print. June 2019	Kvalitative interviews med 16 ergoterapeuter fra tre regionale hospitaler (to somatiske og et psykiatrisk) og tre kommunale institutioner (tre somatiske). De transskriberede interviews blev analyseret med en indholdsanalyse.
6 Enemark Larsen A, Wehberg S, Christensen JR. The validity of the Danish version of the Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Occupational Therapy International, Special edition. April 2020, id 1309104	COPM's validitet blev undersøgt af 11 ergoterapeuter i et tværsnitsstudie, hvor 112 klienter med varierende diagnoser blev inkluderet fra et hospital og et kommunalt rehabiliteringscenter. Validiteten blev undersøgt ved at sammenligne COPM med Occupational Self-Assessment (OSA), verdenssundhedsorganisationens Well-Being Index (WHO-5), og EuroQols fem domæner, fem niveauer spørgeskema (EQ-5D-5L). Disse data blev analyseret med deskriptive statistiske metoder samt Spearmans korrelations koefficient. Yderligere sammenligning mellem COPM og OSA blev gennemført af 11 andre ergoterapeuter hhv. fra otte fra praksis og tre lektorer fra ergoterapeutiske uddannelser. Disse ergoterapeuter sammenlignede items fra COPM med de standardiserede items fra OSA. Overensstemmelsen i deres besvarelser blev analyseret med Fleiss' kappa statistik. Hvorefter de prioriterede items fra COPM og fra OSA blev sammenlignet med deskriptive statiske metoder (frekvenser).
7 Enemark Larsen A, Wehberg S, Christensen JR. Looking into the content of the Canadian Occupational Performance Measure (COPM) – a Danish cross-sectional study. Occupational Therapy International, Special edition. May 2020, id 9573950	De identificerede aktivitetsproblemer fra de 112 klienter, der deltog i validitetsstudiet, indgik i en yderligere vurdering af COPM's indholdsvaliditet. I to undersøgelser blev aktivitetsproblemerne vurderet. Først i forhold til hvilket aktivitetsområde af COPM (egenomsorg, produktivitet og fritid), de kunne klassificeres i. Dernæst deltog seks ergoterapeutiske lektorer fra ergoterapeutuddannelser i Danmark, i en bestemmelse af det taksonomiske niveau (bestemt af Taxonomic Code of Occupational Performance, TCOP) af de prioriterede aktivitetsproblemer.
8 Enemark Larsen A, Wehberg S. Christensen JR. The reliability of the Danish Version of the Canadian Occupational Performance Measure. Submitted August 2020	151 klienter fra to hospitaler og to kommunale rehabiliteringsinstitutioner blev interviewet to gange med COPM, enten af den samme ergoterapeut (intra-rater reliabilitet) eller af forskellige ergoterapeuter (inter-rater reliabilitet). Data blev analyseret med intraclass correlation coefficients (ICC), coefficient of repeatability (CR) og Bland-Altman plots.
9 Enemark Larsen A, Christensen JR, Wehberg S. The responsiveness of the Danish Version of the Canadian Occupational Performance Measure. Working paper.	Test-retest blev gennemført med COPM, WHO-5, EQ-5D-5L-Vas på 88 klienter inkluderet fra et somatisk hospital og to kommunale rehabiliteringsinstitutioner. Ved post-testen blev klienterne ydermere bedt om at besvare to spørgsmål (anker-spørgsmål besvaret på en 6-trin likert-skala gående fra meget bedre udførelse/ meget tilfreds til meget værre udførelse/ meget utilfreds) vedrørende deres umiddelbare oplevelse af forbedring i fht., hvor godt de oplever at kunne udføre deres aktiviteter, og hvor tilfredse de er med den oplevede ændring. Intentionen var at vurdere COPM's evne til at opfange forandring i klienterne aktivitetsudøvelse, herunder bestemme et cut-off punkt, til angivelse af den mindst opnåede forandring, der er udtryk for en reel forandring (Minimal Important Change MIC). Data blev analyseret ved at udregne den gennemsnitlige forandring i COPM og så korrelere den med de opnåede forandringer i WHO-5 og EQ-5D-5L (Spearmans korrelation). Derudover anvendtes box-plots, scatterplots og receiver operating characteristic curves (ROC)